

# บัตรรายงานผลแบบคัดกรอง ASSIST V3.1

## Feedback Form

ชื่อ

วันที่ทดสอบ

### คะแนนความเกี่ยวข้องกับสารเสพติดรายชนิด

สารเสพติด	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	
a. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่ ยาเส้นแบบเคี้ยว ชิการ์ ฯลฯ)		0-3	ต่ำ
		4-26	ปานกลาง
		27+	สูง
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สุรา เบียร์ ไวน์)		0-10	ต่ำ
		11-26	ปานกลาง
		27+	สูง
c. กัญชา (กัญชาแห้ง ยางกัญชา น้ำกัญชา ฯลฯ)		0-3	ต่ำ
		4-26	ปานกลาง
		27+	สูง
d. โคเคน (โค้ก แคร็ก ฯลฯ)		0-3	ต่ำ
		4-26	ปานกลาง
		27+	สูง
e. ยากระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน (ยาบ้า ยาไอซ์ สปีด ยาลดความอ้วน ฯลฯ)		0-3	ต่ำ
		4-26	ปานกลาง
		27+	สูง
f. สารระเหย (กาว ทินเนอร์ เบนซิน ไนตรัส ฯลฯ)		0-3	ต่ำ
		4-26	ปานกลาง
		27+	สูง
g. ยาหล่อมประสาทหรือยานอนหลับ (วาเลียม โรฮิปนอล ดอมิแกม มาโน โซแลม ฯลฯ)		0-3	ต่ำ
		4-26	ปานกลาง
		27+	สูง
h. ยาหลอนประสาท (แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พิซีพี ยาเค ฯลฯ)		0-3	ต่ำ
		4-26	ปานกลาง
		27+	สูง

คะแนนความเกี่ยวข้องกับสารเสพติดรายชนิด (ต่อ)

สารเสพติด	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	
i. สารกลุ่มฝิ่น (ฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีน เมทาโดน บูพรีนอฟิน โคเดอีน ฯลฯ)		0-3	ต่ำ
		4-26	ปานกลาง
		27+	สูง
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ .....		0-3	ต่ำ
		4-26	ปานกลาง
		27+	สูง

**คะแนนของคุณหมายความว่าอย่างไร**

**ต่ำ** หมายถึง คุณมีความเสี่ยงต่ำที่จะมีปัญหาสุขภาพ และปัญหาอื่นๆ ถ้าคุณยังใช้สารเสพติดในลักษณะที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน

**ปานกลาง** หมายถึง คุณมีความเสี่ยงปานกลางที่จะมีปัญหาสุขภาพ และปัญหาอื่นๆ ถ้าคุณยังใช้สารเสพติดในลักษณะที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน

**สูง** หมายถึง คุณมีความเสี่ยงสูงที่จะมีปัญหาร้ายแรง (เช่น ปัญหาสุขภาพ สังคม การเงิน กฎหมาย สัมพันธภาพ) ถ้าคุณยังใช้สารเสพติดในลักษณะที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันและมีโอกาสมากที่คุณจะติดสารเสพติด

## คุณรู้สึกกังวลกับการใช้สารเสพติดของคุณหรือไม่

### A. ยาสูบ/บุหรี่

ความเสี่ยงของคุณที่จะได้รับอันตรายเหล่านี้อยู่ในระดับ...

ต่ำ

ปานกลาง

สูง

การสูบบุหรี่เป็นประจำจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะต่อไปนี้

แก่มาก่อนวัยอันควร ผิวหนังที่เหี่ยวเฉา

สุขภาพไม่แข็งแรง หายใจเวลาเป็นหวัด

ติดเชื้อของทางเดินหายใจ และหอบหืด

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน

แท้งบุตร คลอดก่อนกำหนด และทารกมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำในมารดาที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์

โรคไต

โรคทางเดินหายใจอุดตันเรื้อรัง ภาวะถุงลมโป่งพอง

โรคหัวใจและหลอดเลือด เส้นเลือดในสมองแตก

มะเร็งปอด ภาวะเพาะปัสสาวะ เต้านม ปาก ลำคอ และหลอดอาหาร

### B. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สุรา

ความเสี่ยงของคุณที่จะได้รับอันตรายเหล่านี้อยู่ในระดับ...

ต่ำ

ปานกลาง

สูง

การดื่มสุราเป็นประจำจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะต่อไปนี้

เมาค้าง พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง อุบัติเหตุและบาดเจ็บ คลื่นไส้อาเจียน

สมรรถภาพทางเพศลดลง แก่มาก่อนวัยอันควร

ปัญหาการย่อยอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร ตับอ่อนอักเสบ ความดันโลหิตสูง

วิตกกังวลและซึมเศร้า ปัญหาสัมพันธภาพ ปัญหาการเงินและการทำงาน

หลงลืมง่าย แก้ไขปัญหาได้ไม่ดี

ความพิการแต่กำเนิดและสมองถูกทำลายในทารกที่มารดาดื่มสุราระหว่างตั้งครรภ์

สมองเสื่อมถาวร ทำให้ความจำเสื่อม สติปัญญาเสื่อมลง และการรับรู้เวลา สถานที่ บุคคลผิดปกติ

เส้นเลือดในสมองแตก กล้ามเนื้อและเซลล์ประสาทถูกทำลาย

โรคตับ และโรคของตับอ่อน

มะเร็งของปาก ลำคอ และเต้านม

ฆ่าตัวตาย

### C. กัญชา

ความเสี่ยงของคุณที่จะได้รับอันตรายเหล่านี้อยู่ในระดับ...

ต่ำ

ปานกลาง

สูง

การใช้กัญชาเป็นประจำจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะต่อไปนี้

มีปัญหาด้านสมาธิ และแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆ

วิตกกังวล หวาดระแวง หวั่นวิตก ซึมเศร้า

ความจำและความสามารถในการแก้ไขปัญหาลดลง

ความดันโลหิตสูง

หอบหืด หลอดลมในปอดอักเสบ

อาการวิกลจริต และเป็นโรคจิตในผู้ที่มีประวัติเคยเป็นโรคจิตเภทมาก่อน หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคจิตเภท

โรคหัวใจ และโรคทางเดินหายใจอุดตันเรื้อรัง

มะเร็งของทางเดินหายใจส่วนบนและคอ

### D. โคเคน

ความเสี่ยงของคุณที่จะได้รับอันตรายเหล่านี้อยู่ในระดับ...

ต่ำ

ปานกลาง

สูง

การใช้โคเคนเป็นประจำจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะต่อไปนี้

นอนหลับยาก หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ น้ำหนักตัวลดลง

เหน็บชา เจ็บแปล็บๆ ตามตัว ผิวหนังเหนอะหนะ มีรอยแผลเกาหรือจิกตามผิวหนัง

อุบัติเหตุและบาดเจ็บ ปัญหาการเงิน

ความคิดแบบไม่มีเหตุผล

อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ วิตกกังวล ซึมเศร้า หรือครั่นครางมากเกินไป

หวาดระแวง คิดแบบไร้เหตุผล หลงลืมง่าย

พฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง

อาการวิกลจริต หลังจากใช้ปริมาณมานานๆ

ตายอย่างฉับพลันจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

### E. สารกลุ่มแอมเฟตามีน/ยาบ้า

ความเสี่ยงของคุณที่จะได้รับอันตรายเหล่านี้อยู่ในระดับ...

ต่ำ

ปานกลาง

สูง

การใช้แอมเฟตามีนเป็นประจำจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะต่อไปนี้

นอนหลับยาก เบื่ออาหาร และน้ำหนักตัวลดลง ร่างกายแห้งขาดน้ำ ติดเชื้อง่าย

กรมขบแน่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ

อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ วิดกกังวล ซึมเศร้า กระวนกระวาย ครั่นครังมาก หัวใจวิตก

สั่น หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ หายใจติดขัด

สมาธิไม่ดี หลงลืมง่าย

พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง หวาดระแวง

วิกลจริตหลังจากใช้ปริมาณมานานๆ

เซลล์สมองถูกทำลายอย่างถาวร

ตับถูกทำลาย เลือดออกในสมอง ตายฉับพลันจากความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด

### F. สารระเหย

ความเสี่ยงของคุณที่จะได้รับอันตรายเหล่านี้อยู่ในระดับ...

ต่ำ

ปานกลาง

สูง

การใช้สารระเหยเป็นประจำจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะต่อไปนี้

อาการคล้ายเป็นหวัด ไชน์ส้อกเสบ เลือดกำเดาไหล

คลื่นไส้อาเจียน อาหารไม่ย่อย แผลในกระเพาะอาหาร ท้องเสีย

วิงเวียนและประสาทหลอน ตาพร่ามัว ง่วงซึม การรับรู้เวลา สถานที่ บุคคลเสียไป

ปวดศีรษะ อุบัติเหตุและบาดเจ็บ มีพฤติกรรมอันตรายและคาดเดาไม่ได้

การประสานงานของอวัยวะต่างๆ ผิดปกติ เคลื่อนไหวลำบาก การตอบสนองช้า ออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายน้อย

ความจำเสื่อม งง สับสน ซึมเศร้า ก้าวร้าว เหนื่อยเพลียอย่างรุนแรง

ภาวะเพ้ออย่างรุนแรง ชัก หมดสติ อวัยวะถูกทำลาย (หัวใจ ปอด ตับ ไต)

ตายจากหัวใจวาย

### G. ยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับ (การใช้นอกเหนือจากที่แพทย์สั่ง)

ความเสี่ยงของคุณที่จะได้รับอันตรายเหล่านี้อยู่ในระดับ...

ต่ำ

ปานกลาง

สูง

การใช้ยากล่อมประสาทเป็นประจำจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะต่อไปนี้

ง่วงซึม มึนงง สับสน

ไม่ค่อยมีสมาธิ หลงลืมง่าย

คลื่นไส้ ปวดศีรษะ เหนื่อย

ปัญหาการนอนหลับ

วิตกกังวล ซึมเศร้า

ดื้อยาและติดยาได้ง่ายแม้ใช้ในครั้งสั้นๆ

อาการขาดยาอย่างรุนแรง

ใช้ยาเกินขนาดและตายได้ หากใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารกลุ่มฝิ่น หรือยาเสพติดอื่นๆ

### H. ยาหลอนประสาท

ความเสี่ยงของคุณที่จะได้รับอันตรายเหล่านี้อยู่ในระดับ...

ต่ำ

ปานกลาง

สูง

การใช้ยาหลอนประสาทเป็นประจำจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะต่อไปนี้

ประสาทหลอนทางตา หู สัมผัส และกลิ่น และมีพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้

นอนหลับยาก

คลื่นไส้ อาเจียน

หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง

อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ

วิตกกังวล หวั่นวิตก หวาดระแวง

ความรู้สึกนึกคิดเก่าๆ ย้อนคืนกลับมา

อาการทางจิตแย่ลง เช่น โรคจิตเภทรุนแรงมากขึ้น

## I. สารกลุ่มฝิ่น

ความเสี่ยงของคุณที่จะได้รับอันตรายเหล่านี้อยู่ในระดับ...

ต่ำ

ปานกลาง

สูง

การใช้สารกลุ่มฝิ่นเป็นประจำจะสัมพันธ์กับการเกิดภาวะต่อไปนี้

มีอาการคัน คลื่นไส้ อาเจียน

ง่วงซึม ท้องผูก ฟื้นฟู ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ

ไม่ค่อยมีสมาธิ และหลงลืมง่าย

ซึมเศร้า ความต้องการทางเพศและสมรรถภาพทางเพศลดลง

ปัญหาการเงินและการละเมิดกฎหมาย

มีปัญหาสัมพันธภาพ

มีปัญหาความมั่นคงในการทำงาน และชีวิตครอบครัว

ติดยาและติดยา มีอาการขาดยารุนแรง

ใช้ยาเกินขนาดและตายจากการหายใจล้มเหลว